

【 診療科:乳腺外科 】

【 レジメン登録番号:SB-32 】

〈 CBDCA+PTX療法(原発不明癌) 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)	
			1	21
カルボプラチン	AUC=6	div	○	
パクリタキセル	200mg/m ²	div	○	

【1コース期間: 21 日】

【総コース数: 6~8 コース】

【適応癌種: 原発不明癌】

【時期: 術前、術後 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	デキサート 19.8mg	div(30分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	ガスター 20mg	
	ポララミン 5mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	生理食塩水 100mL	div(30分で)
Rp.3	パクリタキセル 200mg/m ²	div(3時間で)
	生理食塩水 500mL	
Rp.4	カルボプラチン AUC 6	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献: J Clin Oncol 2000;18:3101-7、NCCNガイドライン2017】

【備考:】

【変法療法: イメンド併用時はデキサートの量を9.9mgにする。】