

【 レジメン登録番号:SB-13 】

〈 weeklyPTX+Trastuzumab(q3w)療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)																															
			1		8		15		22		29		36		43		50		57		64		71		78		84							
パクリタキセル	80mg/m ²	div	○		○		○		(○)		○		○		○		(○)		○		○		○		○		(○)							
トラスツズマブBS	初回 8mg/kg 以降 6mg/kg	div	○								○								○								○							

【1コース期間： 84日】

【総コース数: コース】

【適応癌種：乳癌】

【時期：術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休業時の再開基準

投与プロトコール

```
<day1, (22), 43, 64>
```

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ポララミン 5mg	div(全開で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg※1	div(全開で)
	H ₂ R Blocker	
	(5-HT ₂ R Blocker)	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクレタキセル 80mg/m ²	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.5	トラスツスマンBS初回 8mg/kg	div(初回90分で) (2回目から30分でも可)
	以降 6mg/kg	
	生理食塩水 250mL	
Rp.6	生理食塩水 50mL	div(全開で)

<day22>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	トラスツズマブBS 6mg/kg	div(30分で)
	生理食塩水 250mL	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)

`<day8, 15, 29, 36, (50), 57, 71, (78)>`

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	ポララミン 5mg	div(全開で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	デキサート 6.6mg※1	div(全開で)
	H ₂ R Blocker	
	(5-HT ₃ R Blocker)	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	パクリタキセル 80mg/m ²	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献：乳癌診療ガイドライン等】

【備考①： パクリタキセルは、3週投与1週休薬の場合と、毎週投与の場合がある。

【備考②】※1:パクリタキセル2回目以降、デキサート3.3mgでも可。

【変法情報:

〕
 〕
 〕
 〕

東海大学八王子病院