

【 診療科:血液腫瘍内科 】
【 レジメン登録番号:IG-85 】

〈 E-Ld療法 〉

〈1～2コース〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	...	28
レナデックス	28mg/body	p.o.	○			○			○				○			
デキサート	6.6mg	div	○			○			○				○			
エムブリシティ	10mg/kg	div	○			○			○				○			
レブラミド	25mg/body	p.o.	← Day1～21まで内服 →													

〈3コース以降〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	21	22	23	...	28
レナデックス	28mg/body	p.o.	○						○							
	40mg/body					○							○			
デキサート	6.6mg	div	○						○							
エムブリシティ	10mg/Kg	div	○						○							
レブラミド	25mg/body	p.o.	← Day1～21まで内服 →													

【1コース期間:28日間】 【総コース数: 】

【適応癌種:多発性骨髄腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
薬剤投与基準量			

投与プロトコール

〈1～2コース〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	レナデックス 28mg/body	p.o.(分1)	day1, 8, 15, 22
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(15分間で)	day1, 8, 15, 22
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	ボラミン注1A	div(15分間で)	day1, 8, 15, 22
	ガスター注1A		
	生食 50mL		
Rp.4	生食 100mL	div(30分間で)	day1, 8, 15, 22
Rp.5	エムブリシティ10mg/kg	div(添付文書 参考)に)	day1, 8, 15, 22
	注射用水※1		
	生食 250mL		
Rp.6	レブラミド 25mg/body	p.o.(分1)	day1～21

〈3コース以降〉

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	レナデックス 28mg/body	p.o.(分1)	day1, 15
	レナデックス 40mg/body		day8, 22
Rp.2	デキサート 6.6mg	div(15分間で)	day1, 15
	生理食塩水 50mL		
Rp.3	ボラミン注1A	div(15分間で)	day1, 15
	ガスター注1A		
	生食 50mL		
Rp.4	生食 100mL	div(30分間で)	day1, 15
Rp.5	エムブリシティ10mg/kg	div(添付文書 参考)に)	day1, 15
	注射用水※1		
	生食 250mL		
Rp.6	レブラミド 25mg/body	p.o.(分1)	day1～21

【参考文献:N Engl J Med 2015;373:621-31, エムブリシティ点滴静注用添付文書】

【備考※1:エムブリシティの300mg製剤は注射用水13mL、400mg製剤は注射用水17mLで溶解。】

【備考2:エムブリシティは0.22ミクロン以下のインラインフィルターを通して投与する。】

【備考3:レナデックスは、エムブリシティ投与3～24時間前に内服する。】

【備考4:前投薬について
デキサート:エムブリシティ投与の45分前までに投与を終了する。
ボラミン・ガスター:エムブリシティ投与の30分前までに投与を終了する。(ガスターは医師の判断で投与しない場合がある。)
アセトアミノフェン:エムブリシティ投与30～90分前までに投与する。】

【変法情報: