

【 診療科:婦人科】
 【 レジメン登録番号:GY-3 】

〈 TC療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)												
			1	2	3	4	5	6	7	8		15		21	
パクリタキセル	180mg/㎡	div	○												
カルボプラチン	AUC: 5～6	div	○												

【1コース期間: 21日】 【総コース数: 卵巣癌・子宮体癌:6コース、子宮頸癌:制限なし】

【適応癌種: 卵巣癌・子宮頸癌・子宮体癌】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
Plt	100,000 μ L未満	中止	100,000 μ L以上

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	H ₂ Blocker 1A	div(30分で)
	デキサート 16.5mg	
	ポララミン 5mg	
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	パクリタキセル 180mg/m ²	div(3時間で)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.4	カルボプラチン AUC:5~6	div(1時間で)
	5%ブドウ糖 250mL	
Rp.5	フィジオ140 500mL	div(80mL/hで)

【参考文献: J Clin Oncol 33:2129-2135、Gynecologic Oncology 155(2019)413-419】

【変法情報: イメンド(アプレピタント)使用時は、デキサートの投与量を 8.25mg/回に半減する。】