

【 診療科:消化器外科 】

【 レジメン登録番号:SG-138 】

〈 XELOX+Pembrolizumab療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)									
			1	2	3	4		14	15		21	
キイトルーダ	200mg/body	div	○									
オキサリプラチン	130mg/m ²	div	○									
カペシタビン	2000mg/m ² /日	p.o.	タ	←		継続投与				→		朝

【1コース期間: 21 日】

【総コース数:6コース】

【適応癌種: 胃癌 】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
※カペシタビン錠適正使用ガイド参照			

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	キイトルーダ 200mg/body	div(30分で)
	生理食塩水 100mL	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(全開で)
	デキサート 9.9mg	
	生理食塩水 100mL	
Rp.4	オキサリプラチン 130mg/m ²	div(2時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献:Lancet Oncol 2023;24:1181-95. 】

【備考:カペシタビン投与は分2、day1夕食後～day15朝食後

】