

【 診療科:血液腫瘍内科】  
【 レジメン登録番号:IG-124 】

＜ I-Kd 療法 ＞

【1コース目】

|        | 投与量                                                                      | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |     |   |   |     |    |    |     |    |    |     |    |  |   |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|--|---|--|
|        |                                                                          |      | 1             | 2 | ... | 8 | 9 | ... | 15 | 16 | ... | 22 | 23 | ... | 28 |  |   |  |
| サークリサ  | 10mg/kg                                                                  | div  | ○             |   |     | ○ |   |     | ○  |    |     | ○  |    |     |    |  |   |  |
| カイプロリス | 56mg/m <sup>2</sup><br><small>(1コース目のday1,2のみ20mg/m<sup>2</sup>)</small> | div  | ○             | ○ |     | ○ | ○ |     | ○  | ○  |     |    |    |     |    |  |   |  |
| デキサート  | 16.5mg/body                                                              | div  | ○             | ○ |     | ○ | ○ |     | ○  | ○  |     |    | ○  |     |    |  |   |  |
| レナデックス | 20mg/body                                                                | p.o. |               |   |     |   |   |     |    |    |     |    |    |     |    |  | ○ |  |

【2コース目以降】

|        | 投与量                 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) |   |     |   |   |     |    |    |     |    |    |     |    |  |  |  |
|--------|---------------------|------|---------------|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|--|--|--|
|        |                     |      | 1             | 2 | ... | 8 | 9 | ... | 15 | 16 | ... | 22 | 23 | ... | 28 |  |  |  |
| サークリサ  | 10mg/kg             | div  | ○             |   |     |   |   |     | ○  |    |     |    |    |     |    |  |  |  |
| カイプロリス | 56mg/m <sup>2</sup> | div  | ○             | ○ |     | ○ | ○ |     | ○  | ○  |     |    |    |     |    |  |  |  |
| デキサート  | 16.5mg/body         | div  | ○             | ○ |     | ○ | ○ |     | ○  | ○  |     |    |    |     |    |  |  |  |
| レナデックス | 20mg/body           | p.o. |               |   |     |   |   |     |    |    |     |    | ○  | ○   |    |  |  |  |

【1コース期間: 28日】 【総コース数: コース】

【適応癌種:再発または難治性の多発性骨髄腫】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行(再発)

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|----|----|------|----------|
|    |    |      |          |
|    |    |      |          |

【1コース目day1day2】

| Rp   | 薬剤名                        | 投与経路(速度)                   | 投与日     |
|------|----------------------------|----------------------------|---------|
| Rp.1 | デキサート 16.5mg <sup>※1</sup> | div(15分で)                  | day1, 2 |
|      | 生理食塩水 50mL                 |                            |         |
| Rp.2 | ボララミン 5mg                  | div(30分で)                  | day1    |
|      | ファモチジン注 20mg               |                            |         |
|      | アセリオ 650～1000mg            |                            |         |
| Rp.3 | 生理食塩水 50mL                 | div(15分で)                  | day2    |
| Rp.4 | カイプロリス 20mg/m <sup>2</sup> | div(30分で)                  | day1, 2 |
|      | 注射用水(10mgあたり5mLで溶解)        |                            |         |
|      | 5%ブドウ糖液 50mL               |                            |         |
| Rp.5 | サークリサ 10mg/kg              | div(添付文書参照 <sup>※3</sup> ) | day1    |
|      | 生理食塩水 250mL <sup>※2</sup>  |                            |         |

【1コース目day8以降】

| Rp   | 薬剤名                        | 投与経路(速度)                   | 投与日                 |
|------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Rp.1 | ボララミン 5mg                  | div(15分で)                  | day8, 15, 22        |
|      | ファモチジン注 20mg               |                            |                     |
|      | アセリオ 650～1000mg            |                            |                     |
| Rp.2 | デキサート 16.5mg <sup>※1</sup> | div(15分で)                  | day8, 9, 15, 16, 22 |
|      | 生理食塩水 50mL                 |                            |                     |
| Rp.3 | 生理食塩水 50mL                 | div(15分で)                  | day8, 9, 15, 16, 22 |
| Rp.4 | サークリサ 10mg/kg              | div(添付文書参照 <sup>※3</sup> ) | day8, 15, 22        |
|      | 生理食塩水 250mL <sup>※2</sup>  |                            |                     |
|      | カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup> |                            |                     |
| Rp.5 | 注射用水(10mgあたり5mLで溶解)        | div(30分で)                  | day8, 9, 15, 16     |
|      | 5%ブドウ糖液 50mL               |                            |                     |
|      | カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup> |                            |                     |
| Rp.6 | レナデックス 20mg                | p.o.                       | day23               |

【2コース目以降】

| Rp   | 薬剤名                        | 投与経路(速度)                   | 投与日                   |
|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Rp.1 | ボララミン 5mg                  | div(15分で)                  | day1, 15              |
|      | ファモチジン注 20mg               |                            |                       |
|      | アセリオ 650～1000mg            |                            |                       |
| Rp.2 | デキサート 16.5mg <sup>※1</sup> | div(15分で)                  | day1, 2, 8, 9, 15, 16 |
|      | 生理食塩水 50mL                 |                            |                       |
| Rp.3 | 生理食塩水 50mL                 | div(15分で)                  | day1, 2, 8, 9, 15, 16 |
| Rp.4 | サークリサ 10mg/kg              | div(添付文書参照 <sup>※3</sup> ) | day1, 15              |
|      | 生理食塩水 250mL <sup>※2</sup>  |                            |                       |
|      | カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup> |                            |                       |
| Rp.5 | 注射用水(10mgあたり5mLで溶解)        | div(30分で)                  | day1, 2, 8, 9, 15, 16 |
|      | 5%ブドウ糖液 50mL               |                            |                       |
|      | カイプロリス 56mg/m <sup>2</sup> |                            |                       |
| Rp.6 | レナデックス 20mg                | p.o.                       | day22, 23             |

【参考】

【備考<sup>1</sup>: ※1 サークリサ又はカイプロリスと同時に投与する場合は前投薬として投与する。デキサートの代わりにレナデックスの内服投与へ変更可。デキサート注はデキサメタゾンリン酸エステルとして20mg。】

【備考<sup>2</sup>: ※2 総量を 250 mL とする。また、インラインフィルター(0.2または0.22ミクロン)を用いて投与すること。】

【備考<sup>3</sup>: ※3 175 mg / 時の投与速度で点滴静注を開始する。Infusion reaction が認められなかった場合には、投与速度を段階的に上げることができる。ただし、投与速度は 400 mg / 時を超えないこと。】

【備考: 前投薬について; アセリオにボララミン・ファモチジン混注可。アセリオは体重にかかわらず、1000mg投与可。アセリオはアセトアミノフェン錠に変更可。】