〈 RVD lite療法 〉

【1~9コース】

	投与経路	投与スケジュール(day)												
	投与量	仅分社的	1	2	8	9	***	15 16	; ···	21	22	23	 28	35
ボルテゾミブ	1.3mg∕ m i̇́	s.c.	0		0			0			0			
レブラミド	15mg/body	p.o.	0							0				
レナデックス	20mg/body	p.o.	0	0	0	0		0 0)		0	0		

【10~15コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)										
	投 子里		1	• • • •	8		15	• • • •	21	22		•••	28
ボルテゾミブ	1.3mg/ m ²	s.c.	0				0		•		· · ·		
レブラミド	15mg/body	p.o.	0						0				

【適応癌種:多発性骨髄腫 】

【時期: 術前 、 術後 (手術不能·進行·再発)

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準		
ボルテゾミブ					
レブラミド					
レナデックス					

投与プロトコール

【1~9コース】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日		
Rp.1	ボルテゾミブ 1.3mg/㎡		day1, 8, 15, 22		
Κρ. ι	生理食塩水 0.8mL/V	S.C.	day1, 6, 15, 22		
Rp.2	レブラミド 15mg/body	p.o.(分1)	day1∼21		
Rp.3	レナデックス 20mg/body	p.o.	day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23		

【10~15コース】

<u> </u>					
Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日		
Rp.1	ボルテゾミブ 1.3mg/m 生理食塩水 0.8mL/V	S.C.	day1, 15		
Rp.2	レブラミド 15mg/body	p.o.(分1)	day1∼21		

【参考文献: 2018 John Wiley & Sons Ltd, British Journal of Haematology

【備考:16コース以降のレブラミドのメンテナンスは医師の判断にて投与を決定する。

【変法情報: