

【 診療科:呼吸器内科 】
【 レジメン登録番号:IP-53 】

〈 Durvalumab+Tremelimumab+CBDCA+nab-PTX療法 〉

【1-4コース目】

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)							
			1	2	...	8	...	15	...	21
イジウド	75mg/body	div	○							
イミフィンジ	1500mg/body	div	○							
アブラキサン	100mg/m ²	div	○			○			○	
カルボプラチン	AUC5-6	div	○							

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: 4コース】

【5コース目】

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)						
			1		...		29	...	56
イジウド	75mg/body	div					○		
イミフィンジ	1500mg/body	div	○				○		

【1コース期間: 56 日】 【総コース数: 5コース目のみ 】

【6コース目以降】

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)						
			1	2	3	...			28
イミフィンジ	1500mg/body	div	○						

【1コース期間: 28 日】 【総コース数: 6コース目以降は制限なし 】

【適応癌種: 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌・扁平上皮癌) 】

【時期: 術前 、 術後 、 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

投与プロトコール

1-4コース目 <day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	イジウド 75mg/body ^{※1}	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL ^{※2}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(1時間で) 2回目以降全開で投与可
Rp.3	イミフィンジ 1500mg/body ^{※1,3}	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL ^{※4}	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(1時間で) 2回目以降30分で投与可
Rp.5	デキサート 6.6mg	div(15分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.6	アブラキサン 100mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.7	カルボプラチン (AUC:5-6) × (GFR+25)	div(1時間で)
	5%ブドウ糖液 250mL	
Rp.8	生理食塩水 50mL	div(全開で)

1-4コース目 <day8,15>

Rp.1	デキサート 6.6mg	div(10分で)
	5-HT ₃ R Blocker 1A	
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	アブラキサン 100mg/m ²	div(30分で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	生理食塩水 50mL	div(全開で)

【参考文献: J Clin Oncol 41:1213-1227 】

【備考:① 4コース終了後、増悪なければイミフィンジによる維持療法を行う。維持療法期間、イジウドを初回から起算して5コース目の<day29>のみ投与する。 】

【備考:②※1 インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を用いて投与すること。 】

【備考:③※2 イジウドは希釈後の最終濃度が0.1~10mg/mLとなるように調製すること。 】

【備考:④※3 イミフィンジは体重が30kg以下の場合、1回投与量は20mg/kgとする。 】

【備考:⑤※4 イミフィンジは希釈後の最終濃度が1~15mg/mLとなるように調製すること。 】

【備考:⑥ 1-4コース目day1-3にはアプレビタントの併用が推奨される。 】

5コース目<day1> 6コース目以降<day1>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	イミフィンジ 1500mg/body ^{※1,3}	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL ^{※4}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)

5コース目<day29>

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	イジウド 75mg/body ^{※1}	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL ^{※2}	
Rp.2	生理食塩水 50mL	div(全開で)
Rp.3	イミフィンジ 1500mg/body ^{※1,3}	div(1時間で)
	生理食塩水 100mL ^{※4}	
Rp.4	生理食塩水 50mL	div(全開で)