

【 診療科:呼吸器外科 】
【 レジメン登録番号:ST-26 】

〈 アブラキサン単剤療法 〉

| | 投与量 | 投与経路 | 投与スケジュール(day) | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|-------|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 15 | | 21 |
| アブラキサン | 100mg/m ² | div | ○ | | | | | | | ○ | | ○ | | |

【1コース期間: 21 日】 【総コース数: コース】

【適応癌種: 非小細胞肺癌】

【時期: 術前 、 術後 、 **手術不能・進行・再発**】

【休薬・減量に関する要件】

| 項目 | 基準 | 減量内容 | 休薬時の再開基準 |
|-----------|----------------------------------|------|-------------|
| 好中球数 | 投与前で500/mm ³ 未満 | 休薬 | 骨髄機能が回復するまで |
| | 7日間以上にわたって500/mm ³ 未満 | 減量※ | |
| | 次コース投与開始が7日間以上延期となる好中球減少が発現した場合 | | |
| 血小板数 | 投与前で50,000/mm ³ 未満 | 休薬 | 骨髄機能が回復するまで |
| | 7日間以上にわたって50,000/mm ³ | 減量※ | |
| 発熱性好中球減少症 | 発現 | 減量※ | |
| 末梢神経障害 | ≥Grade3 | 休薬 | ≤Grade1 |

※減量の目安は、1段階減量:75mg/m²、2段階減量:50mg/m²

投与プロトコール

| Rp | 薬剤名 | 投与経路(速度) |
|------|-----------------------------|-----------|
| Rp.1 | デキサート 1.65mg | div(10分で) |
| | 5-HT ₃ RB 1A | |
| | 生理食塩液 50mL | |
| Rp.2 | アブラキサン 100mg/m ² | div(30分で) |
| | 生理食塩液 50mL | |
| Rp.3 | 生理食塩液 50mL | div(全開で) |

【参考文献:アブラキサン添付文書】

【備考:アブラキサンは、特定生物由来製品の同意書が必要。初回申請時のレジメンは1コース4週間であり、
1週間の休薬が含まれていたが、適応上休薬は不要であるためレジメン変更申請となつた。】

【変法情報:

東海大学八王子病院