

【 診療科:消化器外科 】

【 レジメン登録番号:SG-69 】

〈 XELOX療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)								
			1	2	3	4		14	15		28
オキサリプラチン	85mg/m ²	div	○					○			
ゼローダ	2000mg/m ² (Max 3000mg/body)	p.o.	夕	←継続投与→					朝		

【1コース期間: 28 日】

【総コース数: 5～6コース 】

【適応癌種: 結腸・直腸癌 】

【時期: 術前、術後、手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準
白血球数	3,000/ μ L未満	中止	3,000/ μ L以上
血小板数	50,000/ μ L未満	中止	50,000/ μ L以上
総ビリルビン	3.0mg/dL以上	中止	3.0mg/dL未満
AST・ALT	100U/L以上	中止	100U/L未満

投与プロトコール

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	YDソリタT3 200mL	div(50mL/h)
Rp.2	5-HT ₃ R Blocker 1A	div(全開)
	生理食塩水 100mL	
Rp.3	オキサリプラチン 85mg/m ²	div(120分で)
	5%ブドウ糖液 250mL	

【参考文献: 】

【備考: ゼローダ投与はday1夕食後～day15朝食後 】

【変法情報: 】