

【 診療科:血液内科】
【 レジメン登録番号:IG-130 】

〈 DKd(Daratumumab+Carfilzomib+Dexamethasone)皮下注療法 〉

【1コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
ダラキューロ	15mL/body	s.o.	○			○			○			○				
カイプロリス	56mg/m ² (Day1,2は20mg/m ²)	div	○	○		○	○		○	○						
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.	○	○		○	○		○	○		○	○			

【2コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール (day)													
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
ダラキューロ	15mL/body	s.c.	○			○			○			○				
カイプロリス	56mg/m ²	div	○	○		○	○		○	○						
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.	○	○		○	○		○	○		○	○			

【1コース期間:28日】

【総コース数:制限無し】

【適応癌種:多発性骨髄腫】

【時期:術前、術後、手術不能・進行・再発】

【1コース】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	カイプロリス 56mg/m ² (day1,2のみ20mg/m ²)	div(30分で)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解)		
	5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	div(15分で)	day1,2,8,9,15,16
Rp.3	ダラキューロ 15mL/body	s.c.(3～5分で投与)	day1,8,15,22
Rp.4	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day 1,2,8,9,15,16,22,23

【2コース】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	カイプロリス 56mg/m ²	div(30分で)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解)		
	5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	div(15分で)	day1,2,8,9,15,16
Rp.3	ダラキューロ 15mL/body	s.c.(3～5分で投与)	day1,8,15,22
Rp.4	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day1,2,8,9,15,16,22,23

【3～6コース】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
ダラキューロ	15mL/body	s.o.	○							○						
カイプロリス	56mg/m ²	div	○	○		○	○			○	○					
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.	○	○		○	○			○	○		○	○		

【7コース以降】

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)													
			1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	23	...	28	
ダラキューロ	15mL/body	s.c.	○													
カイプロリス	56mg/m ²	div	○	○		○	○			○	○					
レナデックス錠	20mg/body/day	p.o.	○	○		○	○			○	○		○	○		

【3～6コース】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	カイプロリス 56mg/m ²	div(30分で)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解)		
	5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	div(15分で)	day1,2,8,9,15,16
Rp.3	ダラキューロ 15mL/body	s.c.(3～5分で投与)	day1,15
Rp.4	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day1,2,8,9,15,16,22,23

【7コース以降】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)	投与日
Rp.1	カイプロリス 56mg/m ²	div(30分で)	day1,2,8,9,15,16
	注射用水(10mgあたり5mLで溶解)		
	5%ブドウ糖液 49mL		
Rp.2	5%ブドウ糖液 50mL	div(15分で)	day1,2,8,9,15,16
Rp.3	ダラキューロ 15mL/body	s.c.(3～5分で投与)	day1
Rp.4	レナデックス錠 20mg/body	分1 p.o.(朝食後)	day1,2,8,9,15,16,22,23

【参考文献:Lancet2020;396:186-197、Haematologica/107 October 2022 2408-2417、ダラキューロ配合皮下注添付文書】

【備考①:75歳以上の患者では、1コース目2週目以降デキサメタゾンの減量を考慮すること。】

【備考②:ダラキューロによる infusion reaction を軽減させるため、
本剤投与開始1～3時間前に副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤及び抗ヒスタミン剤、モンテルカスト錠10mgの前投薬を行う。】