

【 診療科:血液腫瘍内科】  
 【 レジメン登録番号:IG-108 】

## 〈 Venetoclax+Azacitidine療法 〉

	投与量	投与経路	投与スケジュール(day)										
			1	2	3	4	5	6	7	.....	28		
ベネクレクスタ	100~400mg/日	p.o.(1日1回 食後)	← Day1~Day28まで服用 →										
ビダーザ	75mg/m <sup>2</sup>	div	○	○	○	○	○	○	○				

【1コース期間: 28日】      【総コース数: コース】

【適応癌種:急性骨髄性白血病】

【時期: 術前、術後 手術不能・進行・再発】

【休薬・減量に関する要件】

項目	基準	減量内容	休薬時の再開基準

### 投与プロトコール

【day1-7】

Rp	薬剤名	投与経路(速度)
Rp.1	5-HT <sub>3</sub> RB	div(全開で)
	生理食塩水 50mL	
Rp.2	ビダーザ 75mg/m <sup>2</sup>	div(10分かけて) <sup>※</sup>
	注射用水 10mL/1バイアル	
	生理食塩水 50mL	
Rp.3	生理食塩水 50mL	div(フラッシュ用)

【参考文献:N.Engl J Med 2020;383:617-29】

【備考※:薬剤混合調製後、1時間以内に投与を終了させること(薬剤の安定性が低下するため)】

【備考;ベネクレクスタの服用方法。初回の1日目→100mg、2日目→200mg、3日目→400mg、以降400mg/日で継続】

【変法情報:】